


Relative Kornerträge und Reifezeit der Landessortenversuche zu Sojabohnen von 2023 bis 2025

Versuchsansteller: Versuchsstationen des TLLLR sowie benachbarter Landesanstalten und -ämter


Relative Kornerträge (Lössstandorte)

Bezugsbasis = 100 % Säule 1: 2023 = 39,0 dt/ha (4 Orte) Säule 2: 2024 = 44,3 dt/ha (4 Orte) Säule 3: 2025 = 34,5 dt/ha (2 Orte)



Reifezeitdifferenz (Lössstandorte)

Bezugsbasis = 0 Tage Säule 1: 2023 = 13.09.2023 (2 Orte) Säule 2: 2024 = 07.09.2024 (2 Orte) Säule 3: 2025 = 11.09.2025 (1 Ort)



Sorten-Ratgeber für Thüringen

Sojabohne

Aussaat 2026/27



Eigenschaften

(Quelle: Beschreibende Sortenliste unter stärkerer Berücksichtigung der Landessortenversuche des Anbaubereiches)

Sorte	Züchter/Vertrieb	Zulassungsjahr	Vermehrung in Deutschland (ha)		Tausendkorntmasse (+ = hoch)	Rohproteingehalt (Basis 34 % bei 86 % TS)	Ölgehalt	Höhe des ersten Hülsenansatzes (+ = hoch)	Reifeverzögerung des Strohs (+ = gering)	Reifezeit	Pflanzenlänge (+ = kurz)	Standfestigkeit
			2024	2025								
Sussex	NPZ/Saaten-Union	D 2020	110	154	0/-	0	0/+	0/+	0	mfr	0/+	0/+
Cantate PZO	PZ Oberlimpurg/IG Pflanzenzucht	D 2020	40	13	0	0	0	0/-	0/+	mfr	0	0/+
ES Compositor	Lidea Seeds	D 2021	0	0	0	0	+	0/+	0/-	mfp	0	0/+
Sahara	RAGT	D 2023	15	50	0/-	0/+	0/-	0/+	0/+	mfr	0	0/+
SU Ademira	SZ Ackermann	D 2023	32	154	0	-	0	0	0/+	m	0/+	+
SU Cutena	SZ Ackermann	D 2023	12	10	0	0	0	0/+	0/-	mfp	0/-	+
Annabella	Saatbau Linz	D 2023	15	0	0/-	0	0/+	0	0/-	mfp	0/-	0
Vineta PZO	PZ Oberlimpurg/IG Pflanzenzucht	D 2024	16	44	0/-	0/-	+	0/+	+	f	0	0
Arnold	Petersen SZ/Saaten-Union	D 2024	9	70	-	0	+	0	+	f	0	0/+
Atalana	SZ Ackermann	D 2024	14	26	0/-	0	0	0	0/+	mfr	0/+	+
PRO Taranaki	Protealis AG	D 2024	0	0	0/+	+	-	0/-	-	m	0/+	+
Ancagua	Saatbau Linz/IG Pflanzenzucht	D 2024	0	0	0	0	0/+	0/+	0/-	m	0	0/+
Romy	SZ Streng/IG Pflanzenzucht	D 2024	10	42	(0)	(0/-)	(0)	#	#	(m)	(0)	(0/+)
Talisa	SZ Bauer	D 2025	0	4	(+)	(0/-)	(+)	#	#	(m)	(0)	(0/+)
Acassa	SZ Donau	D 2025	0	21	(0/-)	(-)	(+)	#	#	(f)	(0)	(+)

0 = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich
() = vorläufige Einschätzung # = keine Einstufung, da nicht genügend Versuchsergebnisse vorhanden sind

Sorten mit besonderer Eignung für Thüringen

Für Löss- und Verwitterungsstandorte

Reife sehr früh (BSA*-Note 3)
Arnold (vorläufig) – sehr frühe Erntereife, sehr hohe Kornerträge, überwiegend standfeste Sorte mit geringer Reifeverzögerung des Strohs, Tausendkorntmasse im mittlerem Bereich, ebenso der Proteingehalt, hoher Ölgehalt und hoher erster Hülsenansatz

Reife früh bis mittel (BSA*-Note 4 bis 5)
Ancagua (vorläufig) – sehr hohe Kornerträge bei mittlerer Reife, das Stroh der standfesten Sorte kann verzögert abreifen, hoher Hülsenansatz, hoher Ölgehalt, Tausendkorntmasse und Proteingehalt auf mittlerem Niveau
Atalana (vorläufig) – kleinkörnige und kurze Sorte, sehr standfest, hoher Kornertrag mit durchschnittlichen Protein- und Ölgehalten, etwas tieferer Hülsenansatz, Korn- und Strohreife erfolgen gleichzeitig
Sahara – mittlerer Ertragsniveau bei vergleichsweise früher Kornreife, Tausendkorntmasse sowie Ölgehalte sind im Durchschnitt, Proteingehalt ist hoch und überschreitet auch eventuell geforderte 34 %, mittellanges und standfestes Stroh, welches gleichzeitig mit den Körnern zur Reife kommt
SU Ademira – standfeste Sorte mit hohen Erträgen aber geringerem Proteingehalt, der Ölgehalt sowie auch die Tausendkorntmasse sind durchschnittlich
Sussex – frühe Erntereife mit um den Mittelwert schwankendem Kornertrag, werden 34 % Proteingehalt gefordert, wird dieser knapp erreicht, kurzstrohige und standfeste Sorte mit geringer Tausendkorntmasse, höherer Ölgehalt

Adelfia (2025 nicht geprüft) – stabile und gut durchschnittliche Erträge, kurze Pflanzenlänge mit guter Standfestigkeit, etwas frühere Reifezeit bei durchschnittlicher Tausendkorntmasse und Protein- sowie Ölgehalt, Stroh reift gleichzeitig mit den Körnern ab

Reife mittelspät (BSA*-Note 6)
SU Cutena – im Vergleich zu den frühreifen Sorten zwei Wochen später reif, SU Cutena erreicht hohe Kornerträge, ein hoher Hülsenansatz erleichtert den Drusch, standfeste Sorte mit etwas später reifendem Stroh

*Bundesortenamt

Impressum

Herausgeber: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Referat Pflanzenbau und Ökologischer Landbau

Ansprechpartner: Sebastian Lahr
Tel.: +49 361 574067-016
E-Mail: sebastian.lahr@tllr.thueringen.de

Titelfoto: C. Graf

Stand: Januar 2026

Copyright:
Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen und der fotomechanischen Wiedergabe sind dem Herausgeber vorbehalten.